

Calendário de vacinação do nascimento à terceira idade

Caleário Vacinal SBIm 2024 / 2025

Unimed
vacinas

Unimed
Fortaleza

VACINAS	DO NASCIMENTO AOS 10 ANOS DE IDADE															ADOLESCENTE				ADULTO		IDOSO		DISPONIBILIDADE DAS VACINAS																			
	AO NASCER	1 MÊS	2 MESES	3 MESES	4 MESES	5 MESES	6 MESES	7 MESES	8 MESES	9 MESES	12 MESES	15 MESES	18 MESES	24 MESES	4 ANOS	5 ANOS	6 ANOS	9 ANOS	10 A 19 ANOS	20 A 49 ANOS	50 A 59 ANOS	A PARTIR DE 60 ANOS	GRATUITAS NA REDE PÚBLICA	CLÍNICAS PRIVADAS	NOS CRIES*																		
BCG ID	1 Dose Vacinar os não vacinados anteriormente															Vacinar pessoas contactantes de hanseníase								SIM	SIM	NÃO																	
Hepatite B	Três ou quatro doses a partir do nascimento							Vacinar os não vacinados anteriormente															SIM	SIM	SIM																		
Rotavírus	Duas ou três doses dependendo da vacina utilizada (VR1 ou VR5). Iniciar vacinação antes das 15 semanas de vida.							Vacinar os não vacinados anteriormente D1 até 11 meses e 29 dias e última dose até 23 meses e 29 dias							CONTRAINDICADA															SIM	SIM	NÃO											
Tríplice bacteriana (DTPw, DTPa ou dTpa)	Três doses (DTPa ou DTPw) iniciando aos 2 meses de idade										REFORÇO					Reforço com DTPa, DTPw ou dTpa				Reforço com dTpa a partir dos 9 anos de idade e a cada dez anos (ou, na impossibilidade de dTpa, usar dT)						SIM, DTPw e dT; dTpa para gestantes e profissionais da saúde			SIM, DTPa e dTpa		SIM, DTPa												
Haemophilus influenzae b	Três doses iniciando aos 2 meses de idade										REFORÇO					Vacinar pessoas em situações especiais de risco															SIM, três primeiras doses			SIM		SIM							
Poliomielite (vírus inativados)	Três doses iniciando aos 2 meses de idade										REFORÇO					REFORÇO				Vacinar pessoas em situações especiais de risco						SIM, três primeiras doses			SIM		SIM												
Pneumocócicas conjugadas	Duas ou três doses dependendo da vacina utilizada VPC10, VPC13 ou VPC15, iniciando aos 2 meses de idade										REFORÇO					VPC10, VPC13 ou VPC15 – Vacinar os não vacinados anteriormente				VPC13 ou VPC15: vacinar pessoas em situações especiais de risco						VPC13 ou VPC15: uma dose		SIM, VPC10, menores de 5 anos			SIM		SIM, VPC10 e VPC13										
Meningocócicas conjugadas	Duas doses iniciando aos 3 meses de idade										REFORÇO					REFORÇO				Reforço aos 11 anos. Para os não vacinados anteriormente: duas doses, com intervalo de cinco anos				Vacinar pessoas em situações especiais de risco						SIM, menC para menores de 5 anos e menACWY para 11 a 14 anos			SIM		SIM, menC e menACWY								
Meningocócica B	Duas doses iniciando aos 3 meses de idade										REFORÇO					Para os não vacinados anteriormente – Duas ou três doses de acordo com a faixa etária e a vacina utilizada															Vacinar pessoas em situações especiais de risco						NÃO			SIM		NÃO	
Poliomielite oral (vírus vivos atenuados)	CAMPANHAS NACIONAIS DE VACINAÇÃO																														SIM			NÃO		NÃO							
Influenza (gripe)	VACINAÇÃO ANUAL																														SIM, Trivalente menores de 5 anos e maiores de 60 anos			SIM, Tri ou Tetravalente e HD4V (60 anos ou +)		SIM, Trivalente							
Febre amarela	Duas doses: aos 9 meses de vida e aos 4 anos de idade. / Recomendação do PNI: se recebeu a primeira dose antes dos 5 anos, indicada uma segunda dose, independentemente da idade atual. Se aplicada a partir dos 5 anos: dose única. / Recomendação da SBIm: Duas doses. Como há possibilidade de falha vacinal mesmo para quem receber a primeira dose a partir dos 5 anos, a SBIm recomenda uma segunda dose dez anos após. / Essa vacina pode ser exigida para emissão do CIVP, atendendo exigências sanitárias de alguns destinos internacionais. Neste caso, deve ser aplicada até dez dias antes de viajar.																														SIM			SIM		NÃO							
Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)	Duas doses a partir dos 12 meses										Vacinar os não vacinados anteriormente															Vacinar pessoas em situações especiais de risco						SIM, até 59 anos			SIM		NÃO						
Varicela (catapora)	Duas doses a partir dos 12 meses										Vacinar os suscetíveis não vacinados anteriormente															Vacinar pessoas em situações especiais de risco						SIM			SIM		SIM						
Hepatite A	Duas doses a partir dos 12 meses										Vacinar os não vacinados anteriormente															Vacinar pessoas em situações especiais de risco						SIM, uma dose para menores de 5 anos			SIM		SIM						
HPV											Duas doses para meninas e meninos					Vacinar os não vacinados anteriormente. Para menores de 15 anos: duas doses. De 15 anos em diante: três doses.				Vacinar não vacinados e pessoas em situações especiais de risco, a critério médico (três doses)						SIM, HPV4 duas doses para meninas e meninos de 9 a 14 anos.			SIM, HPV9		SIM, HPV4 três doses para homens e mulheres até 45 anos pertencentes a grupos especiais												
Pneumocócica 23 valente	Vacinar pessoas em situações especiais de risco															Duas doses com intervalo de cinco anos						NÃO			SIM		SIM																
Herpes zóster	A partir dos 18 anos, vacinar pessoas em situações especiais de risco															Rotina a partir dos 50 anos						NÃO			SIM		NÃO																
Dengue	Qdenga® recomendada entre 4 e 60 anos independente de contato prévio com o vírus da dengue, duas doses com intervalo de três meses entre elas. Dengvaxia® recomendada entre 6 e 45 anos, somente para soropositivos para dengue, três doses com intervalo de seis meses entre elas.																														SIM, para grupos contemplados pelo SUS			SIM		NÃO							
Covid-19	Acesse os dados atualizados sobre a disponibilidade de vacinas e os grupos contemplados pelo PNI em: sbim.org.br/covid-19																																										
VSR	Nirsevimabe – Dose única para ≤ 1 ano na primeira sazonalidade										Imunizar crianças em situações especiais de risco																	Vacina VSR**		Uma dose		NÃO			SIM		NÃO						
VACINAS	AO NASCER	1 MÊS	2 MESES	3 MESES	4 MESES	5 MESES	6 MESES	7 MESES	8 MESES	9 MESES	12 MESES	15 MESES	18 MESES	24 MESES	4 ANOS	5 ANOS	6 ANOS	9 ANOS	10 A 19 ANOS	20 A 49 ANOS	50 A 59 ANOS	A PARTIR DE 60 ANOS	GRATUITAS NA REDE PÚBLICA	CLÍNICAS PRIVADAS	NOS CRIES*																		
DO NASCIMENTO AOS 10 ANOS DE IDADE															ADOLESCENTE				ADULTO		IDOSO		DISPONIBILIDADE DAS VACINAS																				

14/12/2024 – Orientações, esquemas de doses e comentários devem ser consultados nos Calendários de vacinação SBIm 2024/2025 e nos Calendários de vacinação SBIm pacientes especiais.

Para pacientes com determinadas doenças crônicas e sob orientação médica, consultar os Calendários de vacinação SBIm pacientes especiais.

*Consultar manual do CRIE em [https://sbim.org.br/images/calendarios/manual-dos-centros-de-referenciapara-imunobiologicos-especiais-6a-edicao-2023.pdf%20\(aceso%20em%2027.03.2024\)](https://sbim.org.br/images/calendarios/manual-dos-centros-de-referenciapara-imunobiologicos-especiais-6a-edicao-2023.pdf%20(aceso%20em%2027.03.2024)).

** Arexvy® (GSK) e Abrysvo® (Pfizer) uma dose, aplicar a qualquer momento, independente da sazonalidade. Em idosos de 60-69 anos, em condições de risco e de rotina para > 70 anos.

